

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Doctors Inc.

Doctors Inc is onderdeel van Praktijk Van Loghem BV.

Aanbiedingen

Er zijn kortingskaarten in omloop. Dit zijn de voorwaarden: Kortingskaarten gelden alleen als ze voorafgaand aan de behandeling overhandigd worden aan de behandelend arts. Ze gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen of kortingen. Korting geldt voor Botox, fillers, lipolyse en peelings, maar niet voor Macrolane behandelingen en ook niet voor zogenaamde Botox abonnementen. De kortingskaarten zijn geldig tot 21 december 2010, wanneer de afspraak voor de behandeling gemaakt wordt voor 1 september 2010. Korting geldt voor prijzen zoals gepubliceerd op deze website, op het moment van behandelen. Prijswijzigingen voorbehouden.

Risico's en verantwoordelijkheden

De behandelend arts is medisch verantwoordelijk voor de behandeling. Indien u tijdens het voorafgaande gesprek bepaalde belangrijke informatie aan de arts onthoudt, kan dit tot complicaties leiden. De arts kan in dit geval geen verantwoording nemen voor de complicaties.

Ingrepen van cosmetisch/esthetische aard worden door de Wetgever beschouwd als medische ingrepen. Voorafgaand aan de ingreep dient men goed de noodzaak te hebben overwogen van de voorgenomen ingreep. Het is belangrijk te beseffen dat het esthetisch en/of functionele resultaat kan tegenvallen, ondanks dat de kliniek en de behandelend arts de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht om u zo goed mogelijk te helpen volgens de regelen der kunst. Volledige symmetrie is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk. Wanneer men ontevreden is met het resultaat levert dit geen verplichting voor de kliniek op om een tweede behandeling uit te voeren anders dan tegen de daarvoor geldende tarieven.

Risico's verbonden aan de behandelingen.

Bij iedere medische ingreep bestaat een risico op complicaties en/of bijwerkingen. Lokale verdoving of narcose kan bijvoorbeeld complicaties opleveren (zeer zeldzaam; anafylactische shock). Extra risicofactoren zijn: gebruik van bepaalde medicatie, rookgewoonten, overgewicht, zwangerschap, hoge leeftijd en bepaalde ziekten. In principe behandelen wij alleen gezonde mensen.

Injectables.

De gebruikelijke bijverschijnselen kunnen zijn maar zijn niet gelimiteerd tot: Zeer kleine (speldenprik) bloedinkjes op de injectieplaats

Plaatselijke roodheid van de huid.

Plaatselijke zwelling van de huid.

Blaauwe plek op de plaats van de injecties.

Deze verschijnselen verdwijnen in de meeste gevallen binnen 48 uur of enkele dagen tot weken indien het een blauwe plek betreft. Zeer zeldzame bijwerkingen die kunnen optreden zijn onder andere een allergische reactie, granuloomvorming (verharding) en een infectie. Bij een Botox / Dysport behandeling is het mogelijk dat de geïnjecteerde vloeistof in een aangrenzende spier terecht komt en deze verzwakt. Daarom adviseren wij om de 3 uur na de behandeling geen gezichtsmassages te ondergaan, niet in de ogen (of het behandelde gebied) te wrijven, niet te sporten en niet te gaan stapen. Bij lipolyse behandelingen heeft bijna elke patiënt tijdelijke bijwerkingen na de behandeling, waaronder roodheid, zwelling en spierpijnachtige klachten en, in sommige gevallen bloeduitstortingen. Na enkele dagen tot weken zullen de klachten in het behandelde gebied verdwenen zijn. Ernstige, doch zeer zeldzame bijwerkingen zijn allergische reacties en druknecrose van de huid. Bij sommige Fillerbehandelingen adviseren wij om zelf thuis te masseren. Uw arts zal u hierover informeren. Wij adviseren om gedurende 2 weken na de injectable behandeling niet in de (felle) zon of onder de zonnebank te gaan ter voorkoming van pigmentatie veranderingen.

Peelings.

Na de behandeling kunnen er enkele aan de peeling gerelateerde reacties optreden.

Pijn en gevoeligheid (tijdens en direct na de peeling)

Roodheid (direct na de peeling)

Zwelling (direct na de behandeling tot enkele dagen na de peeling)

Jeuk (enige dagen tot twee weken na de peeling)

Schilfering en vervelling van de huid (begint na enkele dagen na de peeling, tot max 10 dagen)

Deze reacties zijn over het algemeen licht tot matig en verdwijnen gewoonlijk spontaan enkele dagen tot weken na de peeling, afhankelijk van concentratie en het aantal lagen van de peeling die zijn aangebracht. Ook komt het voor dat de huid dunner wordt na de peeling.

Risico's van een chemische peeling:

Als de peeling te diep is geweest, kunnen er mogelijk littekens ontstaan.

Ook het actief lostrekken van vellen en korstjes kan leiden tot littekenvorming. Afhankelijk van het huidtype kunnen er ook hypertrofische (vergrote) littekens of keloiden ontstaan (zeer zeldzaam).

Er kunnen zich plaatselijke pigmentafwijkingen voordoen (hypopigmentatie en hyperpigmentatie). In de meeste gevallen trekken de pigmentveranderingen weg, echter in zeer zeldzame gevallen niet. Om dit te voorkomen is het van het grootste belang dat men gedurende 6 weken voorafgaand aan de peeling en 6 weken na de peeling niet wordt blootgesteld aan UV (zon)licht. Dit doet men door minimaal met factor 32 te smeren, idealiter in combinatie met het Obagi Nu-Derm Systeem.

Een eventuele reeds aanwezige infectie zou kunnen opvlammen (zoals koortslip, acne).

Liposculptuur

Algemene risico's van liposculptuur zijn infectie, nabloedingen, minder mooie littekens en het "waving" effect, waarbij een relif te zien is in het behandelde gebied. Dit kan eventueel met lipolyse verholpen worden. Belangrijk is om gedurende 6 weken na de behandeling dag en nacht compressiekleding te dragen en niet te sporten, maar wel veel te bewegen (lopen). De prijs van de compressiekleding is niet inbegrepen in de prijs van de liposculptuur behandeling.

Macrolane behandeling

Voorafgaand aan een Macrolane borstvergroting dient u een echografie van de borsten of een mamografie te ondergaan. Dit is om bewijs te hebben dat de borsten gezond zijn. Na een Macrolane behandeling adviseren wij om 2-3 dagen vrij te nemen, 2 weken geen sport te beoefenen, 2 weken een stevige (sport) beha te dragen.

Risico's. Direct na de behandeling kunt u de volgende verschijnselen verwachten: roodheid, zwelling, gevoeligheid, pijn, blauwe plek, bloeding, jeuk. Risico's op midden-lange termijn zijn: infectie (0.4%), bobbels in het behandelde gebied, mobiliteit van de geïnjecteerde gel, ontstekingsreactie, pijn of veranderd gevoel.

Langetermijn risico's zijn nog niet beschreven. Er zijn geen aanwijzingen op risico van het ontstaan van kwaadaardige afwijkingen door de gel. Een mogelijk risico is kapselvorming en verharding. Deze bijwerkingen kunnen over het algemeen goed worden verholpen. Aanwezigheid van de gel kan periodiek borstsonderzoek mogelijk lastiger maken.

Cryotherapie

Na de behandeling kunnen er enkele aan de cryotherapie gerelateerde reacties optreden.

Pijn en gevoeligheid (tijdens en direct na de behandeling)

Roodheid (direct na de behandeling)

Zwelling (direct na de behandeling tot ca. 2 weken erna)

Jeuk (enige dagen tot twee weken na de behandeling)

Ontstaan van een blaas onder de huid.

De reacties zijn over het algemeen licht tot matig en verdwijnen gewoonlijk spontaan enkele dagen tot weken na de behandeling, afhankelijk van de tijd van bevroering en het aantal herhalingen.

Risico's van cryotherapie:

Als de bevroering te diep is geweest, kunnen er mogelijk littekens ontstaan. Ook het actief lostrekken van korstjes kan leiden tot littekenvorming. Afhankelijk van het huidtype kunnen er ook hypertrofische (vergrote) littekens of keloiden ontstaan (zeer zeldzaam).

Er kunnen zich plaatselijke pigmentafwijkingen voordoen (hypopigmentatie en hyperpigmentatie). In de meeste gevallen trekken de pigmentveranderingen weg, echter in zeer zeldzame gevallen niet. Om dit te voorkomen is het van het grootste belang dat men gedurende 6 weken na de behandeling niet wordt blootgesteld aan UV (zon)licht. Dit doet men door minimaal met factor 32 te smeren.

Indien het om een verdachte laesie gaat, of wanneer er huidkanker in de voorgeschiedenis of de familie voorkomt, dient de laesie operatief te worden verwijderd, om door de patholoog anatoom te worden beoordeeld. Alleen onverdachte laesies worden met cryotherapie behandeld. Desalniettemin is het mogelijk dat een kwaadaardige laesie wordt behandeld. In dit geval kan de kwaadaardige laesie volledig zijn verwijderd, maar de kans bestaat dat er kwaadaardige cellen over blijven en zich vermeerderen.